



EVERLAB GlutenTest – prosta i szybka diagnostyka nietolerancji glutenu w domu

Indeks: 832935 Producent: Everlab

Cena: **316.29 zł**

Opis

EVERLAB Test nietolerancji glutenu – antytransglutaminazę slgA i wydzielniczą IgA łatwo i szybko ustalić | automatyczny test do domu

Producent: Everlab

- **▮ Sprawdź:** Czy wiesz, że w Niemczech mniej więcej co 100 osób cierpi na nietolerancję glutenu? U osób cierpiących na wchłanianie glutenu prowadzi do zapalenia jelita cienkiego, które z biegiem czasu atakują błonę śluzową jelit i sprawiają, że błona śluzowa jelit może wchłoniąć coraz mniej składników odżywczych. To z kolei prowadzi do objawów niedoboru i innych dolegliwości.
- **▮ OBJAWY:** Czy cierpisz na wzdęcia, biegunkę lub bóle brzucha po spożyciu pokarmów zawierających gluten (makaron, chleb, ciasto itp.)? Następnie sprawdź i sprawdź, czy można wykryć przeciwciała przeciwko enzymowi transglutaminazy tkankowej.
- **▮ Co jest mierzone?** Twój test EVERLAB mierzy w Twojej próbce wartości anty-transglutaminazy-slgA i wydzielniczą IgA. Transglutaminaza tkankowa jest enzymem, który naprawia uszkodzenia naszego ciała. Osoby z nietolerancją glutenu często tworzą przeciwciała, które atakują ten enzym. Test jest zatem ważnym krokiem w diagnostyce nietolerancji glutenu.
- **▮ Szybki i wygodny:** Twój zestaw testowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Pobierasz próbkę krzesła w domu i odesłasz ją do naszego laboratorium z bezpłatną kopertą zwrotną (na terenie Niemiec). Po przeprowadzeniu analizy u nas otrzymasz raport z wyników e-mailem.
- **▮ Zamów już teraz i otrzymaj kompletny zestaw:** sprawdź łatwo i szybko pod kątem nietolerancji glutenu dzięki testowi EVERLAB Selbsttest. Wszystko wliczone w cenę – zestaw testowy, analiza laboratoryjna, raport z wyników drogą mailową.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** Everlab
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0042706530399, 042706530399
- **zalecane węzły przeglądania:** 26948577031
- **punkt znaku wypunktowania:** **▮ Sprawdź:** Czy wiesz, że w Niemczech mniej więcej co 100 osób cierpi na nietolerancję glutenu? U osób cierpiących na wchłanianie glutenu prowadzi do zapalenia jelita cienkiego, które z biegiem czasu atakują błonę śluzową jelit i sprawiają, że błona śluzowa jelit może wchłoniąć coraz mniej składników odżywczych. To z kolei prowadzi do objawów niedoboru i innych dolegliwości., **▮ OBJAWY:** Czy cierpisz na wzdęcia, biegunkę lub bóle brzucha po spożyciu pokarmów zawierających gluten (makaron, chleb, ciasto itp.)? Następnie sprawdź i sprawdź, czy można wykryć przeciwciała przeciwko enzymowi transglutaminazy tkankowej., **▮ Co jest mierzone?** Twój test EVERLAB mierzy w Twojej próbce wartości anty-transglutaminazy-slgA i wydzielniczą IgA. Transglutaminaza tkankowa jest enzymem, który naprawia uszkodzenia naszego ciała. Osoby z nietolerancją glutenu często tworzą przeciwciała, które atakują ten enzym. Test jest zatem ważnym krokiem w diagnostyce nietolerancji

glutenu., ☐ Szybki i wygodny: Twój zestaw testowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Pobierasz próbkę krzesła w domu i odesłasz ją do naszego laboratorium z bezpłatną kopertą zwrotną (na terenie Niemiec). Po przeprowadzeniu analizy u nas otrzymasz raport z wyników e-mailem., ☐ Zamów już teraz i otrzymaj kompletny zestaw: sprawdź łatwo i szybko pod kątem nietolerancji glutenu dzięki testowi EVERLAB Selbsttest. Wszystko wliczone w cenę – zestaw testowy, analiza laboratoryjna, raport z wyników drogą mailową.

- **Opis produktu:** Każdy 100 osób w Niemczech cierpi na nietolerancję glutenu. Pomiar wartości anty-transglutaminazy-sIgA i wydzielniczej IgA jest ważnym krokiem w diagnostyce tej choroby. Transglutaminaza tkankowa jest enzymem, który naprawia uszkodzenia naszego ciała. Osoby z nietolerancją często tworzą przeciwciała, które atakują ten enzym. Przeciwciała możemy wykryć w naszym laboratorium. Objawy, które mogą wskazywać na nietolerancję glutenu: Bóle stawów biegunka, wymioty, nudności Utrata wagi zmiany skórne zmęczenie Bóle głowy Jak działa test? Wystarczy pobrać próbkę krzesła w domu i wysłać je do naszego laboratorium. Analizujemy Twoją próbkę w naszym specjalistycznym laboratorium. Po przeprowadzeniu analizy u nas otrzymasz swoje wyniki e-mailem. Zalecamy omówienie wyników badań z lekarzem, naturopatą lub dietetykiem. Co dokładnie jest testowane? Twój test EVERLAB sprawdzi Twoją próbkę pod kątem przeciwciał transglutaminazy tkankowej IgA i mierzy również wartość sIgA. Aby uzyskać wynik testu, należy spożywać dużą ilość pokarmu zawierającego gluten co najmniej 2 tygodnie przed testem. Co zawiera zestaw? Zestaw próbek do Twojego krzesła Instrukcja obsługi i dowód próbny Torba zwrotna do bezpłatnego zwrotu (na terenie Niemiec) do naszego laboratorium
- **marka:** EVERLAB
- **nazwa przedmiotu:** EVERLAB Test nietolerancji glutenu – antytransglutaminazę sIgA i wydzielniczą IgA łatwo i szybko ustalić | automatyczny test do domu
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-05-02T13:05:52.208Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga opakowania	0,2 kg
Producent	Everlab
Zewnętrzny identyfikator produktu	0042706530399, 042706530399
Zalecane okno przeglądania	26948577031

Zdjęcia

12:34

100%

everlob

Dein Laborbericht

sIgA

Normbereich 510–2040 µg/ml

Dein Ergebnis:

2490 µg/ml



Dein Wert liegt über dem Normbereich und ist damit zu hoch.

Ein erhöhter Wert kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel: